



CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes

Herniación de la mucosa esofágica tras diverticulectomía epifrénica

Herniation of the esophageal mucosa after epiphrenic diverticulectomy



Raquel Escalera Pérez*, Carlos Medina Achirica, Francisco Mateo Vallejo y Francisco José García Molina

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Cádiz, España



Figura 1

Varón de 62 años, diagnosticado de un divertículo gigante epifrénico y espasmo esofágico difuso, al que se le realizó, por vía laparoscópica y toracoscópica, una diverticulectomía, cardiomiectomía y técnica antirreflujo. La miotomía fue más extensa de lo habitual debido a la hiperpresión de todo el tercio inferior del esófago (esófago en sacacorchos). Su evolución fue favorable. Nueve años más tarde presenta cuadros de disfagia ocasionales. En el tránsito baritado se observa dilatación sacular compatible con herniación de la mucosa a través de la zona de la miotomía (fig. 1).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: rakelescalera@hotmail.com (R. Escalera Pérez).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.10.009>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.