



La imagen del mes

Lesión paratiroidea gigante

Giant parathyroid lesion



Ana Hernando Sanz *, María Díaz-Tobarra, María Pilar Salvador Egea
y José María Bordas Rivas

Unidad de Cirugía Endocrina, Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra, Pamplona, España




Figura 1

Varón de 68 años con dolor cervical, disfonía y disfagia. La radiografía de tórax evidencia un ensanchamiento mediastínico y la TAC confirma una masa de 8×4 cm localizada en el mediastino medioposterior con sospecha de infiltración traqueal y esofágica (fig. 1). En la analítica destaca un calcio de 12,7 mg/dL y una PTH de 844 pg/mL. Mediante ecoendoscopia transesofágica se realiza biopsia con diagnóstico de lesión paratiroidea gigante.

Ante la sospecha de malignidad se decide intervenir quirúrgicamente realizando una hemitiroidectomía derecha reglada con linfadenectomía central ipsilateral derecha. Se asocia toracotomía exploratoria, que confirma la infiltración de la porción cartilagomembranosa de la tráquea, siendo irreseccable quirúrgicamente.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ana.hernando.sanz@gmail.com (A. Hernando Sanz).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2017.08.001>

0009-739X/© 2017 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.