



La imagen del mes

Metalobezoar tras intento autolítico

Metallic bezoar after suicide attempt



Cristina Camacho Dorado *, Alba Sánchez Gallego, Jose Ignacio Miota de Llama
y Jose Antonio González Masiá

Cirugía General, Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España




Figura 1




Figura 2

Paciente varón de 44 años de edad, afecto de retraso mental que, tras un intento de autolisis ingiriendo gran cantidad de objetos metálicos, acude a urgencias por cuadro de hemorragia digestiva baja, exteriorizada en forma de melenas. En la placa simple de abdomen (fig. 1) se observa un metalobezoar gástrico y a nivel cecal, que se confirma mediante TAC abdominal. Se intenta la extracción de los objetos metálicos por fibrogastroscopia sin éxito, por lo que se decide laparotomía urgente (fig. 2). Se realiza gastrotomía y colotomía con extracción de 238 tornillos y clavos, con posterior sutura primaria. El paciente fue dado de alta al octavo día del posoperatorio sin ninguna incidencia.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: Criscd1989@gmail.com (C. Camacho Dorado).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2018.02.015>

0009-739X/© 2018 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.