



## La imagen del mes

## Localización preoperatoria mediante arpón de recidiva local de adenocarcinoma de recto tras amputación abdominoperineal



### Preoperative localization through a harpoon of local recurrence of rectal adenocarcinoma after abdominoperineal amputation

Joaquín Manuel Muñoz Rodríguez\*, Isabel Alonso Sebastián, Rosaura Bennazar Nin y Arsenio Sánchez Movilla

Unidad de Cirugía Colorrectal, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Majadahonda, Madrid, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 54 años tratado en 2015 por adenocarcinoma de recto bajo (ypT3N1cM0) mediante radio-quimioterapia neoadyuvante, amputación abdominoperineal y quimioterapia adyuvante. Durante el seguimiento se objetiva en pruebas de imagen (TC, RMN y PET/TC) (fig. 1, RMN) nódulo de 20 × 12 mm en músculo elevador del ano derecho, sugestivo de recidiva local.

Se decide marcaje de lesión con arpón guiado por TC (fig. 2) y extirpación por vía posterior de Kraske. La anatomía patológica informa de «infiltración por adenocarcinoma de patrón intestinal en tejidos blandos presacros» con márgenes libres. El postoperatorio cursó sin incidencias, dándose de alta al paciente el quinto día del postoperatorio.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [munoz.rodriguez.jm@gmail.com](mailto:munoz.rodriguez.jm@gmail.com) (J.M. Muñoz Rodríguez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2018.06.019>

0009-739X/© 2018 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.