



La imagen del mes

Lesión extensa de pared torácica en una paciente con antecedentes de carcinoma de mama



Extensive thoracic skin lesion in a patient with history of breast cancer

Irene López Rojo^{a,*}, Sonia Rivas Fidalgo^a, Adela Gómez Valdazo^b y Mariano Díaz Miguel^a^a Unidad de Cirugía Endocrina y Mama, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España^b Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España

Figura 1

Paciente de 78 años con antecedentes de cáncer de mama bilateral hace 30 años (cuadrantectomía y linfadenectomía axilar bilateral con posterior quimiorradioterapia). Presenta una placa ulcerativa de 25 cm, con áreas cicatriciales y exudativas en región mamaria derecha con crecimiento progresivo durante los últimos 3 años sugestiva de ser una recidiva del carcinoma mamario, o un carcinoma escamoso post-radioterapia (fig. 1). La biopsia cutánea reveló un carcinoma basocelular. Descartado el tratamiento quirúrgico debido a su edad y comorbilidad, fue tratado con inhibidores de la vía de Hedgehog. Inicialmente con itraconazol sin mejoría, se inició tratamiento con vismodegib, presentando una respuesta completa al año del tratamiento.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: irene.lrojo@quironsalud.es (I. López Rojo).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2018.11.007>

0009-739X/© 2018 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.