



La imagen del mes

Enfermedad de Forestier-Rotes-Querol (hiperostosis esquelética idiopática difusa)

Forestier Rotes-Querol disease (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)



Sonia Amoza Pais^{*}, Jose Luis Rodicio Miravalles, Estrella Olga Turienzo Santos y Lourdes M. Sanz Álvarez

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España



Figura 1



Figura 2

Paciente de 72 años con antecedente de hiperostosis esquelética idiopática difusa y colecistectomía por laparotomía media hace 30 años. Consulta por rigidez en la línea media que le impide la flexión del tronco. En la tomografía computarizada se observa crecimiento óseo desde la apófisis xifoides hasta 4 cm por encima del ombligo (fig. 1). No existe una cura para esta enfermedad, pero podemos paliar la clínica, por lo que se realiza intervención quirúrgica para la resección de la estructura ósea de 17 × 4 cm (fig. 2). La anatomía patológica informa de tejido óseo maduro y no presenta recidiva tras 6 meses de seguimiento.

^{*} Autor para correspondencia.

Correo electrónico: amozapais@gmail.com (S. Amoza Pais).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2019.12.012>

0009-739X/© 2020 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de AEC.