



La imagen del mes

La hernia ureteroinguinal: una condición infrecuente a tener en cuenta

The ureteroinguinal hernia: An infrequent condition to keep in mind

Ainhoa Andres Imaz*, Itziar Ariño Hervas, Carmen Grañén García-Ibarrola y Araceli Rodríguez González

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitario Donostia, Donostia, Gipuzkoa, España



Figura 1

Varón de 81 años con apendicitis aguda. En la TC se observa el hallazgo de una hernia inguinal derecha indirecta que contiene uréter ipsilateral, provocando leve hidronefrosis derecha con pelvis extrarrenal, sin repercusión clínica ni analítica. Se realizó apendicectomía laparoscópica sin incidencias y hernioplastia de Nyhus en un segundo tiempo.

La hernia ureteral inguinal es rara. El 80% son hernias indirectas, pudiendo a su vez ser paraperitoneales (80%) o extraperitoneales (20%). Generalmente asintomática y diagnosticada de forma incidental, la complicación más común es la lesión inadvertida durante la hernioplastia. Es característica la imagen radiológica del «uréter en bucle» (fig. 1). El tratamiento es la hernioplastia con una disección precisa y reducción del uréter.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ainhoa.andresimaz@osakidetza.eus (A. Andres Imaz).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.03.013>

0009-739X/© 2020 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.