




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia


Video de mes

Doble revascularización arterial de injerto hepático

Double arterial revascularization of a liver graft



Miguel Ángel Suárez Muñoz ^{a,b,*}, M. Custodia Montiel Casado ^a, Julio Santoyo Villalba ^a
y Julio Santoyo Santoyo ^a

^a Unidad de Trasplante Hepático, Hospital Regional Universitario, Málaga, España

^b Unidad de Cirugía HBP, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España

Paciente de 57 años de edad con poliquistosis hepática e indicación de trasplante por síndrome ocupacional abdominal. Presentaba arteria hepática derecha reemplazada procedente de mesentérica superior (tipo 3 de Michels), y arteria hepática común procedente de tronco celiaco. En el donante se identificó una arteria hepática izquierda procedente de gástrica izquierda de calibre significativo (tipo 5 de Michels). Fue preciso realizar una doble anastomosis arterial (arteria hepática común del receptor con tronco celiaco del donante, y arteria hepática derecha del receptor con arteria esplénica del

donante) para conseguir la adecuada revascularización del injerto, obteniendo finalmente un flujo arterial total de 146 ml/min. La evolución postoperatoria fue favorable.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2023.04.003](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.04.003).

* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: masuarez59@gmail.com, mangel.suarez.sspa@juntadeandalucia.es (M.Á. Suárez Muñoz).
<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.04.003>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.