

Video de mes

Reparación laparoscópica de una hernia diafragmática gigante derecha

Laparoscopic repair of a giant right diaphragmatic hernia

Giulia Vitiello^a, Sonia Fernandez-Ananin^{b,*}, Noelia Pérez Romero^b
y Eduardo M. Targarona^b

^a Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Parc Taulí, Sabadell, España

^b Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España



Hasta el 7% de los pacientes adultos que sufren traumatismo toracoabdominal cerrado presentarán desgarro diafragmático; en el 90% de los casos en el lado izquierdo según la literatura internacional. Las hernias pueden ser agudas o crónicas, según el momento de su presentación clínica. El abordaje, laparoscópico o torácico, para su reparación es aún motivo de discusión [figura 1](#).




Figura 1

Presentamos el caso de una mujer de 70 años, con antecedentes de traumatismo 40 años antes. Tras el estudio de insuficiencia respiratoria y astenia, se diagnosticó por tomografía computarizada de hernia diafragmática gigante derecha. Se realizó reparación laparoscópica del defecto, con una evolución postoperatoria satisfactoria.

Financiación

Ninguna.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2023.03.014](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.03.014).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: sfernandez@santpau.cat (S. Fernandez-Ananin).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.03.014>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.