



CUÁL ES SU MANEJO. RESPUESTA CASO CLÍNICO

Mejor respuesta caso clínico 2, publicado en la primera edición de 2014. Cáncer vesical urotelial localmente avanzado[◇]

Best response to Clinical Case 2, published in the first issue of 2014.
Locally advanced urothelial bladder cancer

María Paula Sáenz Becerra

Miembro Afiliado, Sociedad Colombiana de Urología, Residente III, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

Paciente de 73 años con cáncer de vejiga T2b,N0,M0 (localmente avanzado de alto grado) consulta inicialmente por hematuria que ya tuvo manejo con radioterapia en monoterapia sin mejoría de síntomas y sin cambios en la masa tumoral; considero que el paciente se beneficia de la qui-

mioterapia neoadyuvante a base de cisplatino (MVAC), para conseguir citorreducción y disminuir la posibilidad de micrometástasis, con posterior realización de cistectomía radical más linfadenectomía ampliada y reconstrucción con conducto ileal tipo *bricker* (antecedente de compromiso uretral).

Correo electrónico: mapa.saenz@gmail.com

[◇]Nota del editor de la sección de Oncología, Jaime Andrés Cajigas Plata: revisadas las respuestas del caso anterior, la mejor fue la de la Dra. María Paula Sáenz Becerra. Se evaluó en este caso de carcinoma vesical infiltrante el análisis de la enfermedad (análisis patológico, estudios de extensión, uso de quimioterapia neoadyuvante y procedimiento quirúrgico), con razones para el tipo de derivación que se debe usar.