



## ORIGINAL

## Características y evolución de los pacientes COVID-19 en un centro de salud urbano al inicio de la pandemia



Karen Ruth Barroso López<sup>a,\*</sup>, Paloma Peñasco García<sup>a</sup>, Clara Isabel Soria López<sup>a</sup>,  
María Carmen Pérez Fernández<sup>a</sup>, José Generoso Gómez Cruz<sup>a</sup> e Yolanda González Silva<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Centro de Salud Sisinio de Castro, Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, España

<sup>b</sup> Servicio de Urgencias de Atención Primaria de San Juan, Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, España

Recibido el 30 de julio de 2020; aceptado el 14 de octubre de 2020

Disponibile en Internet el 13 de diciembre de 2020

### PALABRAS CLAVE

Infecciones por coronavirus;  
Atención Primaria de Salud;  
Atención ambulatoria;  
Epidemiología

### Resumen

**Objetivo:** Evaluar las características de los pacientes con SARS-CoV-2 y analizar diferencias entre los que requirieron asistencia hospitalaria y los seguidos ambulatoriamente.

**Diseño:** Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo.

**Emplazamiento:** 2 unidades básicas asistenciales de un centro de salud urbano en Salamanca (España).

**Participantes:** Pacientes  $\geq 18$  años diagnosticados de SARS-CoV-2 entre el 11 de marzo y el 20 de abril.

**Mediciones principales:** Características clínico-epidemiológicas, diagnóstico, tratamiento y desenlace a fecha fin de estudio.

**Resultados:** Ciento veintidós pacientes (63,9% mujeres), 19,7% trabajadores sociosanitarios y 4,9% institucionalizados. Franja etaria predominante: 46-60 años, edad media: 52,1 (DE 17,85). El 67,2% sin comorbilidad. Síntomas más prevalentes: febrícula (73,5%), tos (65,2%) y fiebre (43%). La edad media de los que requieren atención hospitalaria es mayor a los seguidos ambulatoriamente: 59,85 años (DE 16,22) vs. 50,78 (DE 17,88);  $p=0,013$ . El 63,6% del total seguidos por Atención Primaria no presentó disnea, frente a 17 (14,1%) de los que acudieron a Urgencias;  $p=0,001$ . No se realizaron pruebas confirmatorias al 2,5% de los que visitaron el hospital, frente al 61,5% de los seguidos ambulatoriamente;  $p=0,0001$ ; 26 acuden a Urgencias: 11 (9%) ingresaron y 2 (1,6%) fallecieron. El 52,5% no necesitó antibioterapia y el 70,5% no requirió inhaladores. El antipirético más empleado fue paracetamol (78,7%).

**Conclusiones:** Prevalencia en mujeres, personas sin comorbilidad y en la franja de edad de 46-60 años. Las pruebas complementarias y confirmatorias se realizaron mayoritariamente en asistencia hospitalaria. Predominancia de sintomatología leve y evolución favorable. Destacamos el papel de Atención Primaria en la detección, la intervención temprana y el seguimiento en casos graves.

© 2020 Los Autores. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

\* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: [krbarroso@saludcastillayleon.es](mailto:krbarroso@saludcastillayleon.es), [karenruthb@gmail.com](mailto:karenruthb@gmail.com) (K.R. Barroso López).

**KEYWORDS**

Coronavirus  
infections;  
Primary Health Care;  
Epidemiology;  
Outpatient Care

**Characteristics and evolution of COVID-19 in an urban Health Center at the pandemic beginning'****Abstract**

*Objective:* To evaluate SARS-CoV-2 patients' features. To analyse the differences between those who required hospital care and those who didn't.

*Design:* Observational, descriptive and retrospective study.

*Setting:* Two medical practices of an urban health center in Salamanca (Spain).

*Participants:*  $\geq 18$  years diagnosed with SARS-CoV-2 between March 11th and April 20th.

*Main measurements:* clinical-epidemiological characteristics, diagnosis, treatment and outcome at the end of study

*Results:* 122 patients (63.9% female), 19.7% social and health care workers and 4.9% from nursing homes. Predominant age group: 46-60 years. 67.2% without comorbidity. Predominant symptoms: low-grade fever (73.5%), cough (65.2%) and fever (43%). Average age of the patients requiring hospital care was higher: 59.85 (DE16.22) versus 50.78 (DE17.88)  $P=.013$ . 63.6% of all the patients monitored by Primary Health Care and 14.1% of patients that required assistance did not present dyspnea  $P=.001$ . Only 2.5% of the hospital-assisted patients, compared to 61.5% of Primary Health Care, were not tested  $P=.0001$ . 26 patients were attended at an emergency room: 11 (9%) stayed and 2 (1.6%) passed away. No antibiotic or inhaler treatment for 52.5% and 70.5% respectively. The most used antipyretic treatment was paracetamol (78.7%).

*Conclusions:* Prevalence in females, comorbidity-free patients and in age range: 46-60 years. Complementary and confirmatory test were performed mainly in hospital care. Predominance of mild symptoms and favourable evolution. Highlighting the role played by Primary Health Care in detection, early intervention and monitoring of severe cases.

© 2020 The Authors. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

**Introducción**

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud estableció el estado de pandemia por un nuevo agente causal de la familia *Coronaviridae*, el SARS-CoV-2, y cuya enfermedad se ha denominado COVID-19. La epidemia se inició en la región de Hubei (China) a finales de diciembre del 2019, posiblemente en un mercado de animales vivos, marisco y pescados. Los primeros casos descritos fueron neumonías<sup>1,2</sup>.

Tiene una transmisión muy alta por contacto próximo, principalmente con gotas respiratorias y, en menor proporción, vía fecal-oral. La afección principal es la respiratoria (tos seca, disnea, etc.) y fiebre, aunque también se han descrito otros síntomas: dolor torácico, mialgias, diarrea, náuseas, vómitos, odinofagia, disgeusia, anosmia, alteraciones cutáneas, etc. El periodo de incubación medio es de 5-6 días y la duración media desde el inicio de la enfermedad hasta la recuperación es de 15 días si es leve y 3-6 semanas en caso de afectación grave<sup>1-4</sup>.

En España el primer caso confirmado de coronavirus fue el 31 de enero en La Gomera. En Castilla y León los primeros pacientes fueron detectados en Segovia y Valladolid a finales de febrero, todos procedentes de regiones con transmisión comunitaria. En Salamanca, el 2 de marzo, se confirmó el primer paciente con coronavirus, una estudiante que había viajado a Italia. El 9 de marzo se decretó el estado de contención reforzada en nuestro país y el día 15 se amplió a estado de alarma para contener la epidemia<sup>5</sup>. El Centro de Salud Garrido Norte abarca 20.961 tarjetas sanitarias

individuales (TSI) según la Guía de Ordenación Sanitaria de Castilla y León. Nuestro estudio se llevó a cabo en 2 unidades básicas asistenciales de este centro de salud (con 2.846 TSI: 1.402 y 1.444 TSI, respectivamente)<sup>6</sup>.

La pandemia de COVID-19 ha modificado la actividad asistencial a todos los niveles sanitarios, teniendo que diseñar diferentes circuitos y formas de atención<sup>7</sup>. La Atención Primaria desempeñó un papel importante en la contención de pacientes mediante asistencia domiciliaria y seguimiento telefónico de los casos que cursaron con sintomatología leve-moderada, permitiendo rebajar el colapso hospitalario. Asimismo, adquiere gran relevancia durante la desescalada en la gestión de enfermedades crónicas y el seguimiento de pacientes con secuelas de esta enfermedad. Las directrices generales están dando mayor peso a la consulta telefónica, con un correcto seguimiento y solo realizando consulta presencial tras una valoración telemática, para minimizar la transmisión vírica<sup>8</sup>.

Este estudio pretende evaluar las características clínico-asistenciales de los pacientes afectados por SARS-CoV-2 atendidos en 2 cupos de un centro de salud urbano y su evolución en el tiempo, así como las características diferenciales de los que requirieron asistencia hospitalaria.

**Material y métodos**

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo en los 2 cupos citados del Centro de Salud Garrido Norte, Salamanca, incluyendo todos los pacientes mayores de 18 años que fueron diagnosticados de COVID-19 (codificado en

el sistema informático como proceso clínico «Enfermedad por SARS-CoV-2») entre el 11 de marzo y el 20 de abril. El diagnóstico en ese periodo se sustentaba en criterios clínicos, ya que la disponibilidad de pruebas de confirmación diagnóstica en Atención Primaria era limitada. Los criterios de exclusión fueron ser menor de edad, presentar síntomas fuera del periodo descrito y no pertenecer a uno de los cupos estudiados.

Se registraron las siguientes variables:

1. Datos sociodemográficos y características del paciente: edad, franja etaria (18-30 años, 31-45 años, 46-60 años, 61-75 años y  $\geq 76$  años), sexo, ser personal sociosanitario, ser cargo esencial, consumo de tóxicos (no, fumador, exfumador, bebedor, desconocido), posibilidad de aislamiento, agregación familiar, comorbilidad (no, enfermedad respiratoria —enfermedad pulmonar obstructiva crónica/asma—, diabetes, hipertensión arterial, ictus/cardiopatía, enfermedad renal crónica, estados de inmunosupresión —patología oncológica, reumatológica, etc.— o combinación de los anteriores) y tratamientos activos (no, antidiabéticos orales, inmunosupresores, antihipertensivos, otros, combinación de los anteriores).
2. Clínica: tos, fiebre, febrícula, disnea, dolor torácico, astenia, malestar general, artromialgias, hiporexia, náuseas-vómitos, dolor epigástrico, diarrea, disgeusia, anosmia, mareo, cefalea, alteraciones dermatológicas, odinofagia, ansiedad, expectoración, desorientación, otalgia y conjuntivitis.
3. Confirmación diagnóstica: no realizada, PCR, anticuerpos totales, prueba rápida combinada (IgG, IgM), combinación de las anteriores.
4. Pruebas complementarias: radiografía de tórax.
5. Tratamientos prescritos:
  - a. Antibioterapia: no, azitromicina, amoxicilina/amoxicilina-clavulánico, azitromicina + amoxicilina/amoxicilina-clavulánico, levofloxacino; levofloxa-


cino + azitromicina, azitromicina + levofloxacino + cefalosporina, amoxicilina/amoxicilina-clavulánico + azitromicina + levofloxacino + cefalosporina, desconocido.

- b. Antipiréticos: no precisa, paracetamol, metamizol, combinación de los anteriores.
- c. Inhaladores: no, salbutamol, bromuro de ipratropio, salbutamol + bromuro de ipratropio, otros, desconocido.
- d. Hidroxicloroquina.
- e. Sales de rehidratación oral.
- f. Corticoides.
- g. Heparina.
6. Desenlace actual: alta, seguimiento ambulatorio, precisa ingreso (UCI/planta), fallecimiento.
7. Cronología (días desde inicio de síntomas): hasta recuperación, hasta requerir ingreso hospitalario, hasta ingreso en la UCI, hasta fallecimiento.

### Análisis estadístico

Las variables cuantitativas se describieron con media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico en caso de no seguir la normalidad. Para las cualitativas se emplearon frecuencias. La asociación entre variables cualitativas se llevó a cabo mediante la prueba de la chi al cuadrado de Pearson y, en los casos en que no fue apropiado, con la razón de verosimilitud. Se realizó la prueba de la t de Student para muestras independientes en la comparación de valores medios, la alternativa no paramétrica fue la U de Mann-Whitney. Se estableció significación estadística para  $p \leq 0,05$ . Para los cálculos estadísticos se empleó IBM SPSS® for Windows, Version 23.0 (Armonía, NY: IBM Corp).

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) de Salamanca (código referencia PI 2020 04 477) el 11 de junio del 2020.



Esquema general del estudio.

## Resultados

Se incluyó a 122 pacientes; 78 (63,9%) eran mujeres, la edad media fue de 52,71 años (DE 17,85); 24 (19,7%) eran trabajadores sociosanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores de centros de día/residencias, odontólogos e higienistas dentales, cuidadores de ancianos o enfermos, personal de limpieza y mantenimiento de hospitales) y 30 (24,6%) desempeñaban un cargo esencial (policía, guardia civil, trabajadores de ADIF, cajeros de supermercados, etc.). Seis (4,9%) se encontraban institucionalizados. La mayoría 95 (77,9%) tenía posibilidad de aislamiento en habitación individual, aunque en algunos casos el aislamiento fue incompleto por no disponer de baño propio; 37 (30,3%) de los pacientes presentaban algún conviviente con síntomas compatibles. Cabe destacar que 82 pacientes (67,2%) no asociaban comorbilidad, aunque 17 (13,9%) reunían varias enfermedades.

Noventa y seis (78,7%) pacientes fueron seguidos exclusivamente por Atención Primaria y 26 (21,3%) precisaron asistencia hospitalaria.

La edad media de los pacientes que requirieron asistencia hospitalaria fue mayor respecto a los que solo fueron seguidos ambulatoriamente: 59,85 años (DE 16,12) frente a 50,78 (DE 17,88),  $p=0,016$ . La franja de edad predominante en los seguidos ambulatoriamente fue entre 46 y 60 años: 28 (28,9%), mientras que en los que visitaron Urgencias Hospitalarias fue mayor; entre 61 y 75 años: 9 (7,4%),  $p=0,013$ . En el resto de las variables no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (tabla 1).

Los síntomas más prevalentes fueron: febrícula 89 (73,5%); tos 79 (65,2%), y fiebre 52 (43%). Al comparar a los individuos que acudieron a Urgencias hospitalarias con los seguidos exclusivamente por Atención Primaria se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los siguientes síntomas: fiebre, disnea, anosmia y expectoración.

Mayor presencia de fiebre entre los que acudieron al hospital: 17 (14,1%) vs. 9 (7,4%), mientras que de los pacientes seguidos ambulatoriamente 35 (28,9%) registraron fiebre y 60 (49,6%) permanecieron afebriles;  $p=0,009$ .

La mayoría de los pacientes que solo requirieron seguimiento por sus médicos de Familia no presentaron disnea: 77 (63,6%) frente a 18 (14,9%) con disnea, siendo un síntoma predominante en los que precisaron visita a Urgencias hospitalarias: 23 (19%) vs. 12 (9,9%) que no la presentaban,  $p=0,001$ .

Veintiún (17,3%) pacientes referían anosmia. Este síntoma fue poco predominante en ambos grupos: dentro de los seguidos exclusivamente por el centro de salud: 75 (62%) no lo refirieron frente a 20 (16,5%) que lo presentaban, y de los que acudieron a hospital: 25 (20,7%) no lo registraron frente a 1 (0,8%) que lo presentó;  $p=0,02$ . Similar situación respecto a la clínica de expectoración, tan solo se registró en 9 (7,4%) pacientes, todos seguidos ambulatoriamente;  $p=0,03$  (tabla 2).

Se realizó radiografía torácica a 24 pacientes (19,7%). La mayoría de los pacientes con seguimiento ambulatorio no precisaron esta prueba diagnóstica, tan solo se le realizó a 2 (1,6%) frente a 22 (18%) de los que acudieron al hospital,  $p=0,0001$ ; 13 pacientes (10,7%) presentaron alteraciones:

11 (9%) neumonía bilateral, uno (0,8%) neumonía bilobar y uno (0,8%) neumonía unilateral (tabla 3).

Se llevó a cabo PCR a 29 pacientes (23,8%), anticuerpos totales a 6 (4,9%), anticuerpos de banda (IgG, IgM) a 1 (0,8%) y varias pruebas complementarias a 8 (6,6%). De los pacientes con seguimiento ambulatorio, a 75 (61,5%) no se les realizó prueba confirmatoria frente a 3 (2,5%) de los que acudieron a Urgencias,  $p=0,0001$  (tabla 3).

La mayoría de los pacientes no precisaron antibioterapia, 64 (52,5%); de los seguidos ambulatoriamente 60 (49,2%) frente a tan solo 4 (3,3%) de aquellos que precisaron visita hospitalaria, de forma estadísticamente significativa. La combinación amoxicilina o amoxicilina-clavulánico y azitromicina fue la más prevalente 28 (23%). En ambos grupos el paracetamol fue el antipirético más utilizado, en 77 (63,1%) de los seguidos por Atención Primaria y en 19 (15,6%) de los que acudieron a Urgencias hospitalarias,  $p=0,004$ . El 70,5% de la muestra no requirió inhaladores; bromuro de ipratropio fue el más empleado en ambos grupos (tabla 4).

Los tratamientos pautados desde hospital fueron: oxigenoterapia 2 pacientes (1,6%), hidroxiclороquina 16 (13,1%), tocilizumab 3 (2,5%), corticoterapia 5 (4,1%), heparina 5 (4,1%) y lopinavir/ritonavir 5 (4,1%).

A fecha de fin de estudio (20 de abril del 2020), 68 (55,7%) pacientes se encontraban dados de alta, 51 (41,8%) continuaban en seguimiento ambulatorio, 26 habían acudido a Urgencias con una media de 6,74 días desde inicio de síntomas (DE 6,82), 12 (9,8%) ingresaron en una media de 4,75 días desde inicio de síntomas (DE 4,16) y registramos 2 (1,6%) fallecimiento. Los ingresados tenían una mediana de 75 años (rango intercuartílico 34-84). Los fallecidos tenían 75 y 80 años, respectivamente, ambos requirieron ingreso, uno a los 8 días falleciendo el día 10 en planta y el otro a los 10 días en planta, pasando a la UCI a los 16 días y falleciendo el día 39 desde el inicio de los síntomas.

## Discusión

La finalidad de este estudio ha sido conocer las características de la infección por COVID-19 en los pacientes pertenecientes a 2 unidades básicas asistenciales (UBA) de un centro de salud de Salamanca.

Como en investigaciones anteriores de distintas regiones (Wuhan, Singapur, India)<sup>2,8-13</sup>, los síntomas predominantes fueron febrícula, fiebre y tos seca. En nuestra muestra, la disnea fue menos frecuente que en otras series, esto puede ser debido a que muchos estudios incluyen mayoritariamente a los pacientes graves<sup>1,2,9,11,14</sup>. Otra clínica destacable en este estudio fue malestar general y diarrea. Esta última afectó aproximadamente al 30% de los individuos (a diferencia de la literatura donde solo presentaron diarrea entre el 2 y el 10%<sup>2,14</sup>). Sin embargo, la presencia de náuseas y vómitos de nuestra muestra (en torno al 6%) fue similar al 2-5% registrado en otras series<sup>2,14</sup>.

En diferentes observaciones chinas<sup>2,14</sup> se estima que hasta un 80% de los casos cursan de forma leve-moderada. En consonancia con nuestro estudio, menos de un cuarto de los pacientes requirieron asistencia hospitalaria, solo un 10% precisó ingreso y un 2% falleció. Algunos autores, como Galanti et al.<sup>15</sup>, recogen que la letalidad varía

**Tabla 1** Características de los pacientes

	Total n = 122	Seguimiento exclusivo en centro de salud (n = 96)	Precisa visita a Urgencias hospitalarias (n = 26)	p
<b>Sexo</b>				
Varón	44 (36,1)	34 (27,9)	10 (8,2)	0,77 <sup>a</sup>
Mujer	78 (63,9)	62 (50,8)	16 (13,1)	
<b>Edad (años): media (DE)</b>	52,71 (17,85)	50,78 (17,88)	59,85 (16,12)	0,016 <sup>n</sup>
<b>Franja etaria</b>				
18-30 años	15 (12,3)	15 (12,3)	0	0,013 <sup>a</sup>
31-45 años	30 (24,6)	23 (18,9)	7 (5,7)	
46-60 años	32 (26,2)	28 (22,9)	4 (3,3)	
61-75 años	29 (23,8)	20 (16,4)	9 (7,4)	
≥ 76 años	16 (13,1)	10 (8,2)	6 (4,9)	
<b>Personal sociosanitario</b>				
No	98 (80,3)	77 (63,1)	21 (17,2)	0,95 <sup>a</sup>
Sí	24 (19,7)	19 (15,6)	5 (4,1)	
<b>Cargo esencial</b>				
No	92 (75,4)	72 (59)	20 (16,4)	0,84 <sup>a</sup>
Sí	30 (24,6)	24 (19,7)	6 (4,9)	
<b>Consumo de tóxicos</b>				
No	96 (78,7)	78(63,9)	18 (14,8)	0,06 <sup>a</sup>
Fumador	11 (9)	11(9)	0	
Bebedor	1 (0,8)	0	1 (0,8)	
Exfumador	12 (9,8)	6(4,9)	6 (4,9)	
Desconocido	2 (1,7)	1 (0,85)	1 (0,85)	
<b>Posibilidad de aislamiento</b>				
No	27 (22,1)	5 (4,1)	22 (18)	0,11 <sup>a</sup>
Sí	95 (77,9)	91 (74,6)	4 (3,3)	
<b>Agregación familiar</b>				
No	83 (68)	67 (59,9)	16 (13,1)	0,55 <sup>a</sup>
Sí	37 (30,3)	28 (22,9)	9 (7,4)	
Desconocido	2 (1,7)	1 (0,85)	1 (0,85)	
<b>Comorbilidad</b>				
No	82 (67,2)	66 (54,1)	16 (13,1)	0,75 <sup>a</sup>
Patología respiratoria (EPOC/asma)	7 (5,7)	6 (4,9)	1 (0,8)	
Diabetes	0	0	0	
HTA	8 (6,6)	7(5,7)	1 (0,8)	
Ictus/cardiopatía	2 (1,7)	1 (0,85)	1 (0,85)	
Enfermedad renal crónica	0	0	0	
Estados de inmunosupresión	6 (4,9)	4(3,3)	2 (1,6)	
Combinación de las anteriores	17 (13,9)	12(9,8)	5 (4,1)	
<b>Tratamientos activos (n = 120)</b>				
No	85 (70,9)	68 (56,7)	17 (14,2)	0,9 <sup>a</sup>
ADO	1 (0,8)	1 (0,8)	0	
Inmunosupresores	3 (2,5)	2 (1,7)	1 (0,8)	
Antihipertensivos	12 (10)	9 (7,5)	3 (2,5)	
Combinación de los anteriores	13 (10,8)	9 (7,5)	4 (3,3)	
Otros	6 (5)	5 (4,2)	1 (0,8)	

<sup>a</sup> Chi al cuadrado de Pearson/razón de verosimilitud según caso.

<sup>b</sup> Prueba de la t de Student.

<b>Tabla 2</b> Características clínicas				
	Total (n = 121)	Seguimiento exclusivo en centro de salud (n = 95)	Precisa visita a urgencias hospitalarias (n = 26)	p <sup>a</sup>
<i>Tos</i>				
No	42 (34,8)	36 (29,8)	6 (5)	0,16
Sí	79 (65,2)	59 (48,7)	20 (16,5)	
<i>Fiebre</i>				
No	69 (57)	60 (49,6)	9 (7,4)	0,009
Sí	52 (43)	35 (28,9)	17 (14,1)	
<i>Febrícula</i>				
No	32 (26,5)	29 (24)	3 (2,5)	0,06
Sí	89 (73,5)	66 (54,5)	23 (19)	
<i>Disnea</i>				
No	89 (73,5)	77 (63,6)	12 (9,9)	0,001
Sí	32 (26,5)	18 (14,9)	14 (11,6)	
<i>Dolor torácico</i>				
No	107 (88,5)	86 (71,1)	21 (17,4)	0,19
Sí	14 (11,5)	9 (7,4)	5 (4,1)	
<i>Postración-astenia</i>				
No	78 (64,5)	65 (53,7)	13 (10,8)	0,82
Sí	43 (35,5)	30 (24,7)	13 (10,8)	
<i>Malestar general</i>				
No	71 (58,7)	59 (48,8)	12 (9,9)	0,14
Sí	50 (41,3)	36 (29,7)	14 (11,6)	
<i>Artromialgias</i>				
No	104 (85,9)	81 (66,9)	23 (19)	0,67
Sí	17 (14,1)	14 (11,6)	3 (2,5)	
<i>Hiporexia</i>				
No	116 (95,9)	92 (76)	24 (19,9)	0,34
Sí	5 (4,1)	3 (2,5)	2 (1,6)	
<i>Náuseas-vómitos</i>				
No	113 (93,4)	90 (74,4)	23 (19)	0,28
Sí	8 (6,6)	5 (4,1)	3 (2,5)	
<i>Dolor epigástrico</i>				
No	117 (96,7)	92 (76)	25 (20,7)	0,86
Sí	4 (3,3)	3 (2,5)	1 (0,8)	
<i>Diarrea</i>				
No	85 (70,2)	68 (56,2)	17 (14)	0,54
Sí	36 (29,8)	27 (22,3)	9 (7,5)	
<i>Disgeusia</i>				
No	96 (79,4)	72 (59,5)	24 (19,9)	0,07
Sí	25 (20,6)	23 (19)	2 (1,6)	
<i>Anosmia</i>				
No	100 (82,7)	75 (62)	25 (20,7)	0,02
Sí	21 (17,3)	20 (16,5)	1 (0,8)	
<i>Mareo</i>				
No	117 (96,7)	92 (76)	25 (20,7)	0,86
Sí	4 (3,3)	3 (2,5)	1 (0,8)	
<i>Cefalea</i>				
No	99 (81,8)	77 (63,6)	22 (18,2)	0,67
Sí	22 (18,2)	18 (14,9)	4 (3,3)	

**Tabla 2** (continuación)

	Total (n = 121)	Seguimiento exclusivo en centro de salud (n = 95)	Precisa visita a urgencias hospitalarias (n = 26)	p <sup>a</sup>
<i>Alteraciones dermatológicas</i>				
No	119 (98,4)	93 (76,9)	26 (21,5)	0,32
Sí	2 (1,6)	2 (1,6)	0	
<i>Odinofagia</i>				
No	98 (81)	77 (63,6)	21 (17,4)	0,97
Sí	23 (19)	18 (14,9)	5 (4,1)	
<i>Ansiedad</i>				
No	115 (95,1)	91 (75,2)	24 (19,9)	0,49
Sí	6 (4,9)	4 (3,3)	2 (1,6)	
<i>Expectoración</i>				
No	112 (92,6)	86 (71,1)	26 (21,5)	0,03
Sí	9 (7,4)	9 (7,4)	0	
<i>Desorientación</i>				
No	120 (99,2)	95 (78,5)	25 (20,7)	0,08
Sí	1 (0,8)	0	1 (0,8)	
<i>Otalgia</i>				
No	119 (98,4)	93 (76,9)	26 (21,5)	0,32
Sí	2 (1,6)	2 (1,6)	0	
<i>Conjuntivitis</i>				
No	120 (99,2)	94 (77,7)	26 (21,5)	0,49
Sí	1 (0,8)	1 (0,8)	0	

<sup>a</sup> Chi al cuadrado de Pearson/razón de verosimilitud según caso.

**Tabla 3** Confirmación diagnóstica y pruebas complementarias

	Total (n = 122)	Seguimiento exclusivo en Centro de Salud (n = 96)	Precisa visita a Urgencias Hospitalarias (n = 26)	p <sup>a</sup>
<b>Confirmación diagnóstica</b>				
<i>Prueba realizada</i>				
No	78 (63,9)	75 (61,5)	3 (2,5)	0,0001
PCR	29 (23,8)	11 (9)	18 (14,8)	
Anticuerpos totales	6 (4,9)	5 (4,1)	1 (0,8)	
Prueba rápida combinada (IgM/IgG)	1 (0,8)	1 (0,8)	0	
Combinación de las anteriores	8 (6,6)	4 (3,3)	4 (3,3)	
<i>Resultados de la prueba realizada</i>				
Negativo	17 (13,9)	8 (6,5)	9 (7,4)	0,0001
Positivo	26 (21,3)	12 (9,8)	14 (11,5)	
No realizada	78 (64)	75 (61,5)	3 (2,5)	
Pendiente	1 (0,8)	1 (0,8)	0	
<b>Pruebas complementarias</b>				
<i>Radiografía de tórax</i>				
No	98 (80,4)	94 (77,1)	4 (3,3)	0,0001
Sí	24 (19,6)	2 (1,6)	22 (18)	
<i>Neumonía</i>				
No	109 (89,3)	96 (78,6)	13 (10,7)	0,0001
Sí	13 (10,7)	0	13 (10,7)	

<sup>a</sup> Chi cuadrado o razón de verosimilitud (según corresponda).

Tabla 4 Tratamiento

	Total (n = 122)	Seguimiento exclusivo en centro de salud (n = 96)	Precisa visita a urgencias hospitalarias (n = 26)	p <sup>a</sup>
<i>Antibioterapia</i>				
No	64 (52,5)	60 (49,2)	4 (3,3)	0,002
Azitromicina	11 (9,1)	8 (6,6)	3 (2,5)	
Amoxicilina/amoxicilina-clavulánico	6 (4,9)	5 (4,1)	1(0,8)	
Azitromicina + amoxicilina/amoxicilina-clavulánico	28 (23)	17 (13,9)	11 (9,1)	
Levofloxacino	4 (3,2)	2 (1,6)	2 (1,6)	
Levofloxacino + azitromicina	4 (3,2)	2 (1,6)	2(1,6)	
Azitromicina + levofloxacino + cefalosporina	2 (1,6)	1 (0,8)	1 (0,8)	
Amoxicilina/amoxicilina-clavulánico + azitromicina + levofloxacino + cefalosporina	1 (0,8)	0	1 (0,8)	
Desconocido	2 (1,6)	1 (0,8)	1 (0,8)	
<i>Antipiréticos</i>				
Paracetamol	96 (78,7)	77 (63,1)	19 (15,6)	0,004
Metamizol	2 (1,6)	0	2 (1,6)	
Combinación de los anteriores	7 (5,7)	3 (2,4)	4 (3,3)	
No	16 (13,11)	15 (12,3)	1 (0,8)	
Desconocido	1 (0,8)	1 (0,8)	0	
<i>Inhaladores</i>				
No	86 (70,5)	72 (59)	14 (11,5)	0,02
Salbutamol	7 (5,7)	6 (4,9)	1 (0,8)	
Bromuro de ipratropio	20 (16,4)	15 (12,3)	5 (4,1)	
Salbutamol + bromuro de ipratropio	6 (4,9)	1 (0,8)	5 (4,1)	
Otros	1 (0,8)	1 (0,8)	0	
Desconocido	2 (1,6)	1 (0,8)	1 (0,8)	

<sup>a</sup> Chi al cuadrado o razón de verosimilitud según corresponda.

según el momento de la medición. Pese a que al finalizar el estudio algunos pacientes permanecían en seguimiento, nuestra muestra recoge la atención durante 40 días según el momento de inclusión, por lo que creemos que es un periodo representativo de la evolución de esta patología.

A diferencia de otros estudios en los que la infección afectaba predominantemente a varones y pacientes con comorbilidad<sup>1,2</sup>, en el nuestro más de la mitad de la muestra fueron mujeres y personas sin comorbilidad, similar al estudio de Guan et al.<sup>14</sup>, que registró una comorbilidad por debajo del 25%. Sin embargo, el rango de edad con máxima incidencia es la década de los 50 años, como en otras publicaciones<sup>16,17</sup>. La edad (más de 60 años) se encuentra entre los factores de riesgo de complicación en esta patología<sup>16,17</sup>. En nuestro análisis, la mayoría de los que precisaron asistencia hospitalaria presentaban más de 60 años.

Las pruebas complementarias, como la radiografía, se realizaron prioritariamente en aquellos que acudieron a Urgencias hospitalarias, lo cual se puede justificar por sintomatología más grave. Tan solo se objetivó neumonía en un 10%. Asimismo, las pruebas confirmatorias se realizaron predominantemente en aquellos que requirieron atención

hospitalaria, ya que según el «Documento técnico de manejo en atención primaria del COVID-19»<sup>18</sup>, vigente en el periodo en que se realizó el estudio, las indicaciones para solicitarlas incluían únicamente a pacientes con criterios de hospitalización, profesionales sanitarios sintomáticos y personal de servicios sociales. Por este motivo, solo en un tercio de la muestra se realizaron pruebas confirmatorias.

Por la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 se describe en la literatura asociación de casos intrafamiliares y comunitarios<sup>17,19</sup>, hasta de un 85% en algunas series<sup>17</sup>; en nuestro análisis se confirmó casi un tercio de agregación familiar.

Dentro de las limitaciones destacamos que gran parte de las publicaciones se centran en la atención hospitalaria, existiendo poca información en la literatura vinculada a nuestro nivel, el periodo de seguimiento corto, la escasa disponibilidad desde Atención Primaria a pruebas diagnósticas y confirmatorias en el momento del estudio, y un tamaño muestral recortado condicionado a la accesibilidad de los investigadores a solo 2 UBA de un centro de salud urbano.

En nuestra opinión, la capacidad de evaluación y resolución telemática de equipos de Atención Primaria puede



verse influida por los años de experiencia del profesional sanitario y la longitudinalidad de la atención al paciente. Por otra parte, se debe destacar la posibilidad de contar con médicos residentes en consulta (que realizan guardias hospitalarias en el Servicio de Urgencias) facilita los criterios de derivación de pacientes de estas consultas no presenciales, así como domiciliarias. Proponemos la implantación de un sistema de videoconferencia que ayudaría a recabar información a través de la comunicación no verbal. También permite enseñar y comprobar el manejo de inhaladores, pulsioxímetros, tensiómetros, etc., lo que convierte al paciente en proactivo en el cuidado de su salud y facilita la toma de decisiones compartidas.

El conocimiento del paciente por parte del médico a través de la longitudinalidad y accesibilidad (mediante seguimiento telefónico diario y asistencia a domicilio) es un pilar fundamental en la progresión favorable de los pacientes con COVID-19<sup>7,19,20</sup>.

## Conclusiones

En nuestro estudio prevaleció la afectación en las mujeres, pacientes sin comorbilidad y la franja etaria de 46-60 años. Hubo una predominancia de sintomatología leve y resolución favorable. La clínica más prevalente fue fiebre, tos y febrícula, como en otras series. La mayoría de los pacientes no requirieron tratamiento, siendo los más utilizados anti-térmicos y solo precisó antibioterapia menos de la mitad de la muestra.

Las características diferenciales en los pacientes que precisaron asistencia hospitalaria de nuestro estudio fueron: edad superior, mayor presentación de fiebre y disnea y menor referencia a anosmia y expectoración frente a los seguidos exclusivamente de forma ambulatoria.

A la vista de los resultados, pese al escaso tamaño muestral, los médicos de Familia hemos sido responsables de un gran número de pacientes infectados por SARS-CoV-2 sin posibilidad de realizar test, confinados en sus domicilios, evitando así el contagio comunitario. Queremos subrayar la implicación de la Atención Primaria en el manejo de la pandemia, ya que es donde se realizó el seguimiento del mayor volumen de pacientes.

## Autoría

Karen Barroso López: revisión bibliográfica; recogida de datos; redacción de manuscrito original.

Paloma Peñasco García: revisión bibliográfica; recogida de datos; redacción de manuscrito original.

Clara Isabel Soria López: conceptualización; revisión de manuscrito y correcciones; supervisión.

María Carmen Pérez Fernández: revisión bibliográfica; recogida de datos; redacción de manuscrito original.

José Generoso Gómez Cruz: revisión de manuscrito y correcciones; supervisión.

Yolanda González Silva: revisión bibliográfica; análisis estadístico; redacción de manuscrito original.

## Lo conocido sobre el tema

- Hay poca bibliografía acerca de la evolución en Atención Primaria de los pacientes COVID-19.
- La infección por COVID-19 se caracteriza por una gran variabilidad clínica.
- Los nuevos conocimientos facilitan la mejora continua de los protocolos de actuación.

## Qué aporta este estudio

- La infección afectó principalmente a mujeres y a personas sin comorbilidad. El rango de edad con más incidencia fue la década de 50 años.
- Las pruebas complementarias y test diagnósticos se realizaron mayoritariamente en pacientes que precisaron asistencia en urgencias hospitalarias.
- La mayoría de pacientes presentó sintomatología leve y evolución favorable. Destacamos el papel de Atención Primaria en el seguimiento de estos pacientes y en la detección e intervención tempranas de los casos graves.

## Conflicto de intereses

Los autores declaramos no tener conflicto de interés.

## Bibliografía

1. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020;395(10223):497-506.
2. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: A descriptive study. *Lancet*. 2020;395(10223):507-13.
3. World Health Organization. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. Interim Guidance Geneva. 2020. WHO/2019-nCoV/v2020.1. [Internet] [consultado 18 Mayo 2020]. Disponible: [https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125).
4. Ministerio de Sanidad. Secretaría General de Sanidad y Consumo. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Informe técnico. Actualización 18 de mayo de 2020. [Internet] [consultado 18 Mayo 2020]. Disponible: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf>.
5. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo del 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [Internet]. Boletín Oficial del Estado. 14 de marzo de 2020, núm. 67 [consultado 18 Mayo 2020]. Disponible: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463>.
6. Guía de ordenación sanitaria de Castilla y León. Área de Salud de Salamanca. [Internet] [consultado 18 Mayo 2020]. Disponible en: <https://www.saludcastillayleon>.

- es/institucion/es/organizacion/ordenacion-sistema-sanitario/guia-ordenacion-sanitaria-castilla-leon/area-salud-salamanca.ficheros/77569-Salamanca.pdf.
7. Young RA, Burge S, Kumar KA, Wilson J. The full scope of family physicians' work is not reflected by current procedural terminology codes. *J Am Board Fam Med.* 2017;30:724–32.
  8. Greenhalgh T, Huat Koh GC, Car J. COVID-19: A remote assessment in primary care. *BMJ.* 2020;368:m1182.
  9. Young BE, Ong SWX, Kalimuddin S, Low JG, Tan SY, Loh J, et al. Epidemiologic features and clinical course of patients infected with SARS-CoV-2 in Singapore. *JAMA.* 2020;323:1488–94.
  10. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel-coronavirus-infected pneumonia. *N Engl J Med.* 2020;382:1199–207.
  11. Gupta N, Agrawal S, Ish P, Mishra S, Gaiind R, Usha G, et al. Clinical and epidemiologic profile of the initial COVID-19 patients at a tertiary care centre in India. *Monaldi Arch Chest Dis.* 2020 Apr 10;90:1294, doi:+++ 10.4081/monaldi.2020.1294. PMID: 32290644.
  12. COVID-19 National Emergency Response Center, Epidemiology and Case Management Team, Korea Centers for Disease Control and Prevention. Early epidemiological and clinical characteristics of 28 cases of coronavirus disease in South Korea. *Osong Public Health Res Perspect.* 2020;11:8–14.
  13. Habibzadeh P, Stoneman EK. The novel coronavirus: A bird's eye view. *Int J Occup Environ Med.* 2020;11:65–71.
  14. Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *N Engl J Med.* 2020;382:1708–20.
  15. Galanti M, Birger R, Ud-Dean M, Filip Z, Morita H, Comito D, et al. Longitudinal active sampling for respiratory viral infections across age groups. *Influenza Other Respir Viruses.* 2019;13:226–32.
  16. European European Centre for Disease Prevention and Control. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – ninth update [Internet] [consultado 18 Mayo 2020]. Disponible en: Q14 <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapidrisk-assessment-coronavirusdisease-2019-covid-19-pandemicninth-update>.
  17. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 2020 [Consultado 16 mayo 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid19-final-report.pdf>.
  18. Ministerio de Sanidad. Secretaría General de Sanidad y Consumo. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Manejo en Atención Primaria del COVID-19. Documento Técnico [actualizado 17 Mar 2020]. [Internet]. [consultado 18 Mayo 2020]. Disponible: [https://www.researchgate.net/publication/340417359\\_Manejo\\_en\\_atencion\\_primaria\\_del\\_Covid-19\\_Informe\\_Tecnico\\_Ministerio\\_de\\_Sanidad\\_Gobierno\\_de\\_Espana\\_Actualizado\\_17\\_de\\_marzo\\_de\\_2020](https://www.researchgate.net/publication/340417359_Manejo_en_atencion_primaria_del_Covid-19_Informe_Tecnico_Ministerio_de_Sanidad_Gobierno_de_Espana_Actualizado_17_de_marzo_de_2020)
  19. Minué Lorenzo S. Contra el coronavirus, más Atención Primaria que nunca. *AMF.* 2020 [Internet] [Consultado 14 mayo 2020]. Disponible en: <https://amf-q16semfyc.com/web/articlevier.php?id=2626>.
  20. Kutscher E, Kladney M. Primary care providers: Discuss COVID-19-related goals of care with your vulnerable patients now. *J Q17 Gen Intern Med.* 2020;35:2195–6.