

## Página del residente

### ¿Cuál es su diagnóstico?

### What would your diagnosis be?

Daniel García-Molina<sup>a,\*</sup>, Javier González-Martin<sup>a</sup>, Elena Ruiz-Bravo<sup>b</sup>,  
Belén Goiburú<sup>b</sup> e Inés Gómez<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Departamento de cirugía oral y maxilofacial, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

<sup>b</sup> Departamento de anatomía patológica, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

#### INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 25 de enero de 2013

Aceptado el 29 de marzo de 2013

Mujer de 52 años, sin antecedentes de interés, que acude a consulta por múltiples tumoraciones faciales, en región frontal y en cuero cabelludo.

A la exploración física presenta varias tumoraciones redondeadas, eritematosas, con superficie lisa y brillante, bien delimitadas, de consistencia firme, de tamaño variable (de 0,5 a 2 cm) y algunas de ellas dolorosas a la palpación (fig. 1).

La paciente refiere la aparición progresiva de las mismas, desde hace 10 años.

No hay otros miembros de su familia afectados por un cuadro similar.

Se toma biopsia de 2 de ellas, las más dolorosas (fig. 2).

¿Cuál es su diagnóstico?




Figura 1 – Imagen macroscópica de la paciente.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [dr.garciamolina@gmail.com](mailto:dr.garciamolina@gmail.com) (D. García-Molina).

1130-0558/\$ – see front matter © 2013 SECOM. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.maxilo.2013.03.003>



**Figura 2 – Histología de la lesión con tinción de hematoxilina eosina.**

### Financiación

El estudio no ha recibido financiación

### Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.maxilo.2013.03.003>

## ¿Cuál es su diagnóstico?

### What would your diagnosis be?

**Vanessa Chávez-Bonilla \***, Ramón Luaces-Rey e  
Álvaro García-Rozado Jose Luis López-Cedrún

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España

#### INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

*Historia del artículo*

Recibido el 14 de mayo de 2013

Aceptado el 16 de julio de 2013

#### Caso clínico

Varón de 73 años, sin antecedentes de interés, que acude a nuestra consulta para valoración de tumoración de consistencia ósea localizada en reborde infraorbitario izquierdo de 3 años de evolución (fig. 1). La lesión es de aproximadamente 1,5 cm de diámetro, asintomática y no está adherida a planos cutáneos. No produce dolor ni parestesias.



**Figura 1 – Preoperatorio.**

\* Autora para correspondencia.

Correo electrónico: [vanessacbc@hotmail.com](mailto:vanessacbc@hotmail.com) (V. Chávez-Bonilla).