



Medicina Paliativa

www.elsevier.es/medicinapaliativa



BIBLIOTECA TELEMÁTICA

Biblioteca telemática. Entrega 51

Telematic library. Instalment 51

Ana de Santiago Ruiz

Hospital Centro de Cuidados Laguna, Madrid, España

Consulte en nuestra web <http://www.secpal.com/biblioteca/> los siguientes artículos comentados:

Evaluación de las interacciones medicamentosas en pacientes tratados con antidepresivos en un centro oncológico terciario.

Lal LS, Zhuang A, Hung F, Feng c, Arbuckle R, Fisch MJ. Evaluation of drug interactions in patients treated with antidepressants at a tertiary care cancer center. *Support Care Cancer*. 2012;20:983-989.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España.

Efecto de Qigong sobre la función cognitiva, la calidad de vida, y un biomarcador de inflamación en pacientes con cáncer: un ensayo controlado aleatorizado.

Oh B, Butow PN, Mullan BA, Clarke SJ, Beale PJ, Pavlakos N, et al. Effect of medical Qigong on cognitive function, quality of life, and a biomarker of inflammation in cancer patients: A randomized controlled trial. *Support Care Cancer*. 2012;20(6):1235-1242.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España.

La conciencia de morir: necesita palabras.

Lokker ME, van Zuylen L, Veerbeek L, van der Rijt CC, van der Heide A. Awareness of dying: It needs words. *Support Care Cancer*. 2012;20:1227-1233.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España.

Dolor y sufrimiento en pacientes con demencia avanzada: eligiendo las herramientas más idóneas para su abordaje.

Jordan A, Regnard C, O'Brien JT, Hughes JC. Pain and distress in advanced dementia: Choosing the right tools for the job. *Palliat Med*. 2012;26(7):873-878.

Comentado por Miguel Ángel Cuervo Pinna, Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos, Badajoz, España.

Síntomas gastrointestinales, electrogastrografía, marcadores inflamatorios y la valoración subjetiva del paciente con cáncer avanzado.

Chasen M, Bhargava R. Gastrointestinal symptoms, electrogastrography, inflammatory markers, and PG-SGA in patients with advanced cancer. *Support Care Cancer*. 2012;20:1283-1290.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España.

Eficacia de la rotación opioide a hidromorfona parenteral en pacientes con cáncer avanzado en los que han fallado otros opioides

Oldenmenger WH, Lieveerse PJ, Janssen PJ, Taal W, van der Rijt CC, Jager A. Efficacy of opioid rotation to continuous parenteral hydromorphone in advanced cancer patients failing on other opioids. *Support Care Cancer*. 2012;20:1639-1647.

Correo electrónico: anadsantiago@yahoo.es

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España.

Incidencia y causas de reacciones locales relacionas con las bombas de jeringa en cuidados paliativos: Un estudio prospectivo en un hospice.

Mitchell K, Pickard J, Herbert A, Lightfoot J, Roberts D. Incidence and causes for syringe driver site reactions in palliative care: A prospective hospice-based study. Palliat Med. 2012;26(8):979-985.

Comentado por Miguel Ángel Cuervo Pinna, Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos, Badajoz, España.

Olanzapina para el alivio de las náuseas en pacientes con cáncer avanzado y obstrucción intestinal incompleta.

Kaneishi K, Kawabata M, Morita T. Olanzapine for the relief of nausea in patients with advanced cancer and incomplete bowel obstruction. J Pain Symptom Manage. 2012;44(4):604-607.

Comentado por Ana de Santiago, Hospital Centro de Cuidados Laguna, Madrid, España.

Las experiencias de los familiares con la práctica de la sedación paliativa: una revisión sistemática.

Bruinsma SM, Rietjens JA, Seymour JE, Anquinet L, van der Heide A. The experiences of relatives with the practice of palliative sedation: A systematic review. J Pain Symptom Manage. 2012;44(3):431-445.

Comentado por Ana de Santiago, Hospital Centro de Cuidados Laguna, Madrid, España.

Tratamiento del hipo crónico en pacientes con cáncer. Una revisión sistemática.

Calsina-Berna A, García-Gómez G, González-Barboteo J, Porta-Sales J. Treatment of chronic hiccups in cancer patients: A systematic review. J Palliat Med 2012;15:1142-1150.

Comentado por José-Javier de Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España.

Reingresos a los 30 días en ancianos con enfermedad grave.

Enguidanos S, Vesper E, Lorenz K. 30-day readmissions among seriously ill older adults. J Palliat Med. 2012;15:1356-1361.

Comentado por José-Javier de Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España.

El papel de la talidomida y el placebo en el tratamiento de los síntomas de anorexia-caquexia tumoral. Resultados de un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo.

Yennurajalingam S, Willey JS, Palmer JL, Allo J, del Fabbro E, Cohen EN, et al. The role of thalidomide and placebo for the treatment of cancer-related anorexia-cachexia symptoms: Results of a double-blind placebo-controlled randomized study. J Palliat Med. 2012;15:1059-1064.

Comentado por José-Javier de Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España.