Noticias

Ayudas Merck Serono de Investigación Clínica en Endocrinología

La Fundación Salud 2000 ha convocado las Ayudas Merck Serono de Investigación, que llegan a su 20ª edición en el año 2011. Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos inéditos de investigación clínica en endocrinología llevados a cabo en el territorio español. Cada ayuda se otorgará a un único proyecto de cada una de las diferentes áreas de investigación, entre las que se encuentra la de endocrinología, y estará dotada con 20.000 euros. Los solicitantes pueden enviar sus trabajos en papel por correo certificado a las oficinas de Fundación Salud 2000 (c/ General Martínez Campos, 41, 3.ª planta, 28010 Madrid), o preferiblemente en formato electrónico a fundacionsalud2000@fundacionsalud2000.com. Pueden consultar las bases de la convocatoria, el esquema de presentación del proyecto y el modelo de currículum normalizado en la web de la Fundación (http://www.fundacionsalud2000.com/ES/ayudas_serono.php).

La fecha límite para la recepción de los proyectos es el próximo 29 de octubre de 2010.

III Curso-Taller de Formación Continuada de la SED

Se ha abierto el periodo de inscripción para la tercera edición del Curso-Taller de Formación Continuada de la SED, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en Madrid. Las solicitudes, que deberán ir dirigidas a la sede de la Sociedad, se aceptarán por riguroso orden de inscripción. El curso, sólo para miembros de la SED, está

acreditado con 1,3 créditos SEAFORMEC y contará con ponentes como los doctores Eduard Montanya, Javier Lafita, Águeda Caballero, Javier Ampudia, Raquel Barrio y Alfonso Calle. En el programa científico de este año se tratarán los siguientes temas: novedades en el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular en la diabetes tipo 2, novedades en el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2 y novedades en el diagnóstico de la diabetes.

Más información en la web de la SED.

VII Curso de Diabetes de la SED para residentes de Medicina de Familia

Laboratorios Esteve ha organizado un curso para residentes de último año de Medicina de Familia, que tengan un interés especial en la diabetes. Este curso tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre en el parador de La Granja de San Ildefonso (Segovia). El Comité Científico estará formado por los doctores Sara Artola, Javier Díez Espino, Javier García Soidán, Javier Lafita y Antonio Pérez. El programa tiene previstos bloques temáticos como la fisiopatología de la diabetes mellitus, el diagnóstico y la clasificación de la diabetes, las habilidades en la visita diabética, si la diabetes es equivalente a la enfermedad vascular, dieta y fármacos orales, complicaciones crónicas de la diabetes, complicaciones agudas en la diabetes, y la insulinización, en el marco de clases teóricas y también de talleres prácticos, que se organizarán en grupos rotativos. La conferencia de clausura, a cargo de la Dra. Ana Chico, versará sobre sen-

sores y monitorización continua de la glucemia, sistemas de infusión (indicaciones y uso de las bombas de insulina), el futuro de la diabetes mellitus y los nuevos tratamientos. Si desean más información o inscribirse en el curso, consulten la web de la SED.

Los pacientes tratados con metformina presentan un descenso de vitamina B₁₂

Un ensayo clínico ha puesto de manifiesto que la metformina, un fármaco en general bastante bien tolerado, tiene como efecto secundario indeseado una malabsorción de la vitamina B₁₂ y de folato. Todo ello puede incrementar las concentraciones de homocisteína, que es un factor de riesgo cardiovascular. En el ensayo se incluyeron 390 pacientes en tratamiento con insulina, de entre 30 y 80 años, a los que se administraron 850 mg de metformina u placebo, tres veces al día. Todos ellos completaron un tratamiento de 4 años. Al comparar ambos grupos, el tratado con metformina tuvo un 19% menos de concentración de vitamina B₁₂, un 5% menos de folatos y un 5% de incremento de homocisteína. En 19 pacientes de este grupo (9,9%) se encontró una deficiencia de vitamina B₁₂ frente a sólo 5 (2,7%) en el grupo placebo. El número de pacientes necesario para producir una deficiencia fue de 13,8 después de 4,3 años de ingerir metformina. Más información en la fuente original: De Jager J, Kooy A, Lehert P, Wulffele MG, Van der Kolk J, Bets D, et al. Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B-12 deficiency: randomised placebo controlled trial. *BMJ*. 2010; 340:c2181. ■