



FE DE ERRORES

Fe de errores de «Posibles efectos adversos del tratamiento supresor de la TSH en el carcinoma diferenciado de tiroides»

Jordi L. Reverter* y Eulalia Colomé

Servei d'Endocrinologia i Nutrició, Departament de Medicina, Hospital Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Badalona, Barcelona, España

En el artículo «Posibles efectos adversos del tratamiento supresor de la TSH en el carcinoma diferenciado de tiroides» (Endocrinol Nutr. 2011;58(2):75-83), se ha detectado un error en la [tabla 2](#) de la página 79. Reproducimos a continuación la tabla correcta:

Tabla 2 Propuesta de estratificación de los objetivos de TSH de acuerdo al riesgo de recidiva o progresión del cáncer de tiroides y el riesgo de eventuales complicaciones de la tirotoxicosis subclínica por el tratamiento inhibidor de la TSH

	Riesgo derivado del cáncer diferenciado de tiroides	
	Alto	Bajo
<i>Possible riesgo de la supresión de la TSH</i>		
Alto	TSH 0,1-0,5 mU/l	TSH 0,5-2 mU/l
Bajo	TSH < 0,1 mU/l (¿indetectable?)	TSH 0,5-2 mU/l

Tomada de la cita 105.

Véase contenido relacionado en DOI: [10.1016/j.endonu.2010.09.007](https://doi.org/10.1016/j.endonu.2010.09.007)

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: reverter.germanstrias@gencat.cat (J.L. Reverter).