Imágenes

Síndrome de vena cava superior y omalgia: ¿qué esconde detrás?

Superior vein cava syndrome and omalgia: What is hidden behind?

Lucía Moreno Obregón^a, Juan Moreno Obregón^a, Fernando Moreno Obregón^{b,*}
y David León Jiménez^c

^a Medicina Familiar y Comunitaria, Distrito Este, Sevilla, España

^b Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud Adoratrices, Huelva, España

^c Unidad de Riesgo Vascular, Medicina Interna, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

Varón de 56 años, caucásico y fumador de un paquete diario durante 36 años hasta hace 2 años. Acudió a consulta rutinaria del centro de salud por dolor lancinante de hombro derecho y parestesias de un mes de evolución. Se irradiaba a escápula y mano ipsilateral; interfería con el descanso nocturno y era refractario a la toma de antiinflamatorios. Además, asociaba edema y cambios de coloración en miembro superior derecho (MSD). Sin embargo, negaba síntomas como: disnea, tos, hemoptisis, disfonía, fiebre, sudoración profusa nocturna o síndrome constitucional.

Exploración: en cabeza y cuello no presentaba ptosis palpebral, pero sí aumento de partes blandas en región laterocervical derecha. En el tórax se palpaban adenopatías en fosa supraclavicular derecha de consistencia pétreo, no móviles y adheridas a planos profundos, así como circulación colateral en plano anterior derecho (Imagen 1), pero sin edema en esclavina. En MSD se apreciaba edema y coloración eritemato-violácea de toda la extremidad así como la ausencia de acropaquias.

En la radiografía de tórax (Imagen 2) destacaba, como hallazgo más significativo, el ensanchamiento mediastínico paratraqueal derecho.

Tras una primera valoración se sospechó de enfermedad mediastínica de origen tumoral. Finalmente, se diagnosticó de carcinoma pulmonar de células pequeñas con tromboembolismo pulmonar¹ de ramas arteriales subsegmentarias dependientes de la arteria lobar superior derecha con dímero D normal. No obstante, en MSD a pesar de presentar dicha exploración, se descartó la presencia de TVP².

El síndrome de vena cava superior (SVCS) es un cuadro clínico grave definido por la obstrucción del flujo sanguíneo de la vena cava superior (VCS) hacia la aurícula derecha, ya sea por compresión extrínseca o por invasión de la misma. Se suele observar con mayor frecuencia entre la quinta y sexta décadas de la vida.

Imagen 1. Circulación colateral (flechas) en plano anterior derecho de la pared torácica. En la parte inferior, un plano más cercano.

Entre un 60–85% de los casos la etiología suele ser de causa maligna, secundaria a proceso neoplásico subyacente. Entre las más frecuentes están: el cáncer de pulmón no microcítico o de células pequeñas y el linfoma no Hodgkin. Otras menos frecuentes serían el carcinoma tímico por invasión intraluminal³ o las metástasis⁴. Las causas no malignas representan entre un 15–40%: trombosis de la VCS (por vasculitis o uso prolongado de catéteres o marcapasos, causa que va en aumento), tumores benignos (teratoma o timoma), procesos infecciosos (cada vez menos frecuentes) e incluso esquizofrenia inducida por anfetaminas con SVCS⁵.

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: fmorenobregon@hotmail.com (F. Moreno Obregón).

Imagen 2. Radiografía de tórax PA. Ensanchamiento mediastínico paratraqueal derecho en relación con adenopatías (flechas). Silueta cardíaca normal. Callos de fractura en 3.º, 4.º, 5.º y 7º arcos costales izquierdos.

También destacar el hecho de que el diagnóstico es fundamentalmente clínico y que, tras su sospecha inicial, la técnica de imagen de elección es la radiografía de tórax (prueba al alcance

de cualquier médico) siendo el hallazgo más frecuente el ensanchamiento mediastínico. Por otra parte, también se recomienda realizar un diagnóstico diferencial en el que incluyamos todas las causas, teniendo en cuenta las más frecuentes, pero sin descartar las excepcionales. Para finalizar, los pacientes que comienzan con un SVCS como manifestación inicial de un tumor maligno, tienen un peor pronóstico en comparación con estos que lo desarrollaron después del diagnóstico inicial.

Bibliografía

- 1 Chin CG, Yeh JS, Lin YK, Tam WC. Superior vena cava syndrome complicated with acute pulmonary thromboembolism in a patient with lung cancer. *J Cardiol Cases* 2017;17:9–11, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jccase.2017.08.004>.
- 2 Delgado Ramos GM, Almaddah N, Alsafwah. Superior vena cava syndrome with concomitant upper extremity deep vein thrombosis. *Intern Emerg Med* 2018, <http://dx.doi.org/10.1007/s11739-018-1979-7>.
- 3 Rosa Salazar V, Guirado Torrecillas L, Hernández Contreras ME. Superior vena cava syndrome as the initial manifestation of thymic carcinoma. *Arch Bronconeumol* 2012;48:386–7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2012.03.003>.
- 4 Keshvani N, Yek C, Johnson DH. Pemberton's sign in SVC syndrome from metastatic renal cell carcinoma. *BMJ Case Rep* 2018;28:2018, <http://dx.doi.org/10.1136/bcr-2018-224190>, pii: bcr-2018-224190.
- 5 Dircks S, Dubois M, Dassa D. Psychotic symptoms associated with superior vena cava syndrome following methamphetamine abuse. *Prim Care Companion CNS Disord* 2018;20, <http://dx.doi.org/10.4088/PCC.17102253>, pii: 17102253.