Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2009;60(3):267)

Mordisqueo yugal

Figura 1. Alteración de la mucosa que le confiere un aspecto rizado en la zona de las mejillas.

Criterios de diferenciación

- Epitelio no desprendible (sólo algunos jirones).
- Lesiones pequeñas puntiformes.
- Localización característica: mejillas, borde de la lengua.
- Pacientes sometidos a estrés.
- Sin afectación del estado general.
- Con frecuencia pacientes jóvenes.

Diagnósticos diferenciales

Lesiones tóxicas: a menudo otras localizaciones.

Enfermedades ampollosas: menos jirones tisulares, erosiones, restos de ampollas en bordes.

Leucoplasia: ausencia de lesiones, ausencia de jirones tisulares.

Leucoplasia vellosa: borde de la lengua, alteración estriada, VIH.

Saburra: falta de autolimpieza, localizaciones distintas a las caras yugales.

Tratamiento

Informar al paciente, intentar controlar el hábito.

Correspondencia: Wolfgang Bengel.
Röhrenbach 1, 88633 Heiligenberg, Alemania.

Candidiasis en la mejilla

Figura 2. Recubrimientos desprendibles en la zona de las mejillas (Colección Dr. Ludwig, Ulm).

Criterios de diferenciación

- Recubrimiento desprendible, eliminable con una gasa.
- Ausencia de lesiones, fondo inflamatorio.
- Localización inespecífica.
- Sin anamnesis de estrés.
- Posible enfermedad de base, afectación del sistema inmunitario.
- A cualquier edad, pero más frecuente en la vejez.

Diagnósticos diferenciales

Leucoplasia: no desprendible.

Lesiones epiteliales tóxicas: anamnesis, parcialmente desprendibles, no eliminables con una gasa.

Depósito de fibrina: más compacto, confluyente, cubre la lesión.

Liquen plano oral: no desprendible, no eliminable con una gasa.

Saburra: falta de autolimpieza.

Tratamiento

Tratamiento antimicótico.