

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2009;60(6):691)

Afta



Figura 1. Lesión erosivo-ulcerosa en la lengua.

Criterios de diferenciación

- Dolor.
- Aparición rápida (en cuestión de horas).
- Autolimitada.
- Sólo edema, sin infiltración.
- Más frecuente en no fumadores.
- El paciente tiene un «historial» de aftas.

Diagnósticos diferenciales

Neutropenia: hemograma, ausencia de margen protésico.

Úlcera de decúbito: descartar causas mecánicas.

Infección por virus del herpes simple: varios focos solitarios.

Primoinfección luética: serología, menos doloroso.

Tratamiento

Corticosteroides tópicos.

Carcinoma de células escamosas en la lengua



Figura 2. Alteraciones ulcerosas en la lengua (Colección Prof. Hagedorn, Darmstadt).

Criterios de diferenciación

- El dolor no es el síntoma predominante.
- Aparición más insidiosa (en cuestión de semanas).
- No se autolimita.
- Infiltrado palpable.

- Más frecuente en fumadores.
- La anamnesis no es concluyente.

Diagnósticos diferenciales

Afta mayor: cuadro agudo, dolor.

Primoinfección luética: serología, aparición aguda, auto-limitada.

Úlcera de decúbito: descartar causas mecánicas.

Agranulocitosis: hemograma, ausencia de infiltrado.

Tratamiento

Centro especializado.