



ÍNDICE DE AUTORES

Fernando Álvarez Goenaga

*Unidad de Pie y Tobillo, Hospital San Rafael,
Barcelona*

Marta Arroyo Hernández

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid*

Rosa Busquets Net

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona*

Andrés Carranza Bencano

*Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla, Sevilla*

Sandra Catalán Amigo

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Fremap, Barcelona*

Jordi Codina Santolaria

*Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Manresa,
Barcelona*

Miki Dalmau

*Laboratorio de Anatomía Artroscópica y Quirúrgica,
Departamento de Patología y Terapéutica Experimental
(Unidad de Anatomía Humana),
Universitat de Barcelona, Barcelona
Escuela de Ciencias de la Salud de Manresa,
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya,
Vic, Barcelona*

Antonio Dalmau Coll

Hospital Asepeyo, Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Magdalena Edo Llobet

*Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Manresa,
Barcelona*

Betlem Fargues

*Laboratorio de Anatomía Artroscópica y Quirúrgica,
Departamento de Patología y Terapéutica Experimental
(Unidad de Anatomía Humana),
Universitat de Barcelona, Barcelona*

José Juan Fernández Torres

*Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla,
Sevilla*

Nicolás Fontecilla Cornejo

Clínica Indisa, Santiago de Chile

Lorena García Lamas

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid*

Borja Gutiérrez

*Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo, Cirugía
Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario Quirón Madrid
Facultad de Medicina, Universidad Europea,
Madrid*

María José Gutiérrez Morales

*Unidad de Pie y Tobillo,
Hospital Universitario de Canarias,
San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife*

Mario Herrera Pérez

*Unidad de Pie y Tobillo, Hospital Universitario de
Canarias, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz
de Tenerife
Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina,
Universidad de La Laguna, San Cristóbal
de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife*

Ernesto Maceira

*Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo, Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Hospital Universitario
Quirón Madrid
Facultad de Medicina, Universidad Europea, Madrid*

Andrea Manent Molina

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Consorti Sanitari Integral, L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona*

Xavier Martín Oliva

*Profesor de Anatomía, Universidad de Barcelona,
Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Clínica Nostra Senyora del Remei, Barcelona*

Pilar Martínez de Alborno

*Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo, Cirugía
Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario Quirón Madrid
Facultad de Medicina, Universidad Europea,
Madrid*

Manuel Monteagudo

*Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo, Cirugía
Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario Quirón Madrid
Facultad de Medicina, Universidad Europea, Madrid*

Jorge Muriano Royo

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Consorti Sanitari Integral, L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona*

Enrique Navarrete Faubel

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Cristina Ojeda-Thies

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid*

Isabel Parada Avendaño

*Unidad de Pie y Tobillo, Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Consorci Sanitari Integral
(HSJDMB-HGH), Barcelona*

Estefanía Prada Chamorro

*Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla, Sevilla*

Eduard Rabat

*Unidad de Cirugía del Pie y Tobillo,
Hospital Quirón Barcelona, Barcelona*

Juan Manuel Ríos Ruh

*Cirugía de Pie y Tobillo y Cuidados del Pie Diabético,
Clínica Diagonal, Barcelona*

Alberto Ruiz Nasarre

*Unidad de Pie y Tobillo, Hospital San Rafael,
Barcelona*

Josep Maria Saló i Orfila

*Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa,
Manresa, Barcelona
Facultat de Ciències de la Salut,
Universitat de Manresa, Manresa, Barcelona*

María Sánchez González

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Alejandro Santamaría Fumas

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Consorti Sanitari Integral, L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona*

Sergio Tejero

*Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla,
Sevilla*

Josep Torrent

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Terrassa,
Barcelona*

Jordi Vega

*Laboratorio de Anatomía Artroscópica y Quirúrgica,
Departamento de Patología y Terapéutica Experimental
(Unidad de Anatomía Humana), Universitat de
Barcelona, Barcelona
Unidad de Cirugía del Pie y Tobillo, Hospital Quirón
Barcelona, Barcelona*

Vicente Vicent Carsí

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Jesús Vilà y Rico

*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid*

Ramón Viladot Pericé

Clínica Tres Torres, Barcelona

Antonio Viladot Voegli

*Clínica Tres Torres, Barcelona
Expresidente de la Sociedad Española de Medicina y
Cirugía del Pie y Tobillo (SEMCP)
Expresidente de la European Foot and Ankle Society
(EFAS)*

Carlos Villas Tomé

*Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación,
Facultad de Medicina, Universidad de Navarra,
Pamplona
Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona*